



BIOASEKURACJA W STAJNI

Działania zapobiegające wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych

✓ **Monitoruj swojego konia**

Regularnie mierz temperaturę ciała. Jeśli zwierzę wykazuje objawy takie jak brak apetytu, apatię, kaszel, wydzielina z nosa, skontaktuj się z lekarzem weterynarii. W przypadku wystąpienia choroby lub jej podejrzenia mierzenie temperatury zalecane jest codziennie u wszystkich koni w stajni.

W stajni

✓ **Protokół przyjmowania nowych koni do stajni**

Przed przybyciem zwierzęcia, potwierdź aktualność szczepienia przeciwko grypie oraz omów z lekarzem weterynarii inne badania przesiewowe pod kątem chorób zakaźnych. Nowo przybyłe zwierzę odizoluj na 3 tygodnie.

✓ **Miejsce kwarantanny**

Wyznacz miejsce do izolacji dla nowych lub chorych koni.

✓ **Polityka szczepień**

Nie powinna to być alternatywa dla zasad bioasekuracji. Szczepienia ograniczają objawy oraz rozprzestrzenianie się choroby.

✓ **Higiena rąk**

Myj ręce pomiędzy obsługą kolejnych zwierząt w stajni.

✓ **Dedykowany sprzęt dla każdego konia w stajni**

✓ **Wyprowadzanie na pastwisko**

W małych, spójnych grupach na tereny z podwójnym ogrodzeniem, zapobiegającym kontaktom bezpośrednim.

W podróży

- ✓ Nie zabieraj koni na zawody, jeśli u jakiegokolwiek zwierzęcia w stajni stwierdzono lub podejrzewa się chorobę zakaźną, np. zołzy, zakażenie herpeswirusem.
- ✓ Używaj **własnego sprzętu**, w tym wiader na wodę. Unikaj ogólnodostępnych poidel.
- ✓ Nie wypasaj konia na wspólnych pastwiskach. Uwiąż konia obok siatki z sianem, najlepiej w indywidualnym boksie, jeśli jest to możliwe.
- ✓ **Unikaj kontaktu** swojego konia z innymi zwierzętami oraz dotykania Twojego konia przez osoby postronne.
- ✓ **Zdezynfekuj** sprzęt, pojazd, obuwie po powrocie z podróży.

BIOASEKURACJA W STAJNI

Działania zapobiegające wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych

Cechy „idealnego” miejsca do izolacji zwierząt

- ✓ Oddzielny budynek/padok
- ✓ Minimum 10 metrów, a najlepiej 25 metrów od innych budynków/padoków
- ✓ Brak współdzielenia przestrzeni powietrznej z innymi zwierzętami w obiekcie
- ✓ Oddzielny sprzęt, łącznie z paszą, wiaderkami na wodę, siatkami na siano, osprzętem jeździeckim, łopatami i widłami do sprzątania boksów
- ✓ Oddzielne miejsce składowania obornika
- ✓ Oddzielna obsługa do koni przebywających w izolacji
- ✓ Miejsce do umycia rąk oraz mata dezynfekcyjna w wejściu do budynku

Brak dedykowanego pomieszczenia do izolacji?

- ✓ **W których miejscach najczęściej przemieszczają się konie?** Odizoluj konia z dala od wszelkich ścieżek, ciągów komunikacyjnych, po których przemieszcza się dużo zwierząt
- ✓ **Czy w obiekcie znajduje się oddzielna stajnia/budynek, z którego można przemieścić zwierzęta, aby umieścić tam konia na kwarantannie?** Jeśli nie, upewnij się, czy możesz odizolować konia tak, żeby nie miał kontaktu z innymi zwierzętami w stajni. Wejście do stajni oznacz taśmą ostrzegawczą.
- ✓ **Czy koń poddany kwarantannie może przebywać całą dobę na pastwisku?** Jeśli tak, wygrodź część padoku, tak by zapobiec kontaktowi bezpośredniemu z innymi zwierzętami.
- ✓ **Czy do obiektu mają dostęp inne osoby?** Jeśli tak, wyraźnie oznacz miejsce kwarantanny
- ✓ **Czy jest możliwość, aby wyznaczona osoba zajmowała się jedynie izolowanym koniem?** Jeśli nie, to konia na kwarantannie należy obsługiwać w odzieży ochronnej, jako ostatniego w kolejności.

**Zeskanuj kod QR i obejrzyj animację
Bioasekuracja i postępowanie
w trakcie wybuchu choroby**

