



EVERY DROP PERFECTLY BALANCED

8 KROKÓW DO SUKCESU

Dechra

1

PRZESTRZEGAJ ZALECONEJ DAWKI

Lekarz weterynarii oblicza dawkę na podstawie masy ciała leczonych zwierząt i ilości pobieranej przez nich wody. Przestrzegając zalecanej dawki unika się ryzyka podania zbyt małej (brak skuteczności leczenia) lub zbyt dużej ilości leku (rozwój antybiotykooporności).



2

OTWÓRZ OPAKOWANIE SOLUSTAB

Załóż rękawiczki oraz maseczkę, aby uniknąć kontaktu ze skórą lub przypadkowej inhalacji. W celu ograniczenia pylenia przy otwieraniu opakowania:

- użyj ostrego noża lub nożyczek
- nie ściskaj opakowania, ani nie próbuj go rozrywać



3

ODWAŻ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PRODUKTU

Korzystaj ze sklaibrowanej wagi. Dawkę dla substancji płynnych można odmierzyć na podstawie objętości, natomiast w przypadku proszków nie jest to dokładna metoda. Nie wysypuj proszku, użyj łyżki, aby ograniczyć pylenie.



4

PRZECHOWUJ PRODUKT WE WŁAŚCIWYCH WARUNKACH

Otwarte opakowanie zabezpiecz klipsem lub nakrywką. Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu. Nie wystawiaj produktu na działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury.



5

PRZYGOTUJ ROZTWÓR PODSTAWOWY

Do odmierzonej ilości wody dodaj produkt i mieszaj, aż do momentu całkowitego rozpuszczenia się leku. Ustaw pompę dozującą.



6

PRZEPŁUCZ LINIĘ POJENIA

Każdorazowo, przed rozpoczęciem leczenia, należy przepłukać linię pojenia, aby usunąć osady lub biofilm i możliwie jak najszybciej zapewnić zwierzętom dostęp do wody z lekiem. W celu sprawdzenia czy woda z lekiem dotarła do smoczków, do roztworu z lekiem można dodać barwnik.



7

MONITORUJ

Rejestruj początek i koniec każdego leczenia. W trakcie leczenia, sprawdzaj pobór wody oraz stan zdrowia zwierząt conajmniej dwa razy dziennie.



8

PRZEPŁUCZ LINIĘ POJENIA

Po zakończeniu terapii, ponownie przepłucz linię pojenia, aby usunąć ewentualne pozostałości leku w rurociągu.

